

不活化ポリオ

接種回数・接種量

	接種回数	接種量
任意接種	下記参照	0.5 ミリリットル皮下接種

不活化ポリオワクチンについて

- アフリカの一部、南アジアの一部などポリオの流行地に渡航される方は、追加接種を受けていかれることをお勧めします。

接種回数

2012 年 9 月 1 日からは生ポリオワクチンに代わり、不活化ポリオワクチンが定期接種となりました。

それ以前の方は、生ポリオワクチンの接種回数により不活化ポリオワクチンの接種回数が異なります。

不活化ポリオワクチンの接種年齢、回数、間隔は 3 種混合ワクチンと同じで標準的な接種年齢は次のとおりです。

- 生ポリオワクチンを 1 回も接種していない方:不活化ポリオワクチン 4 回接種
初回接種（3 回）：生後 3 カ月～12 カ月（20 日以上の間隔をおく）
追加接種（1 回）：初回接種から 12 カ月～18 カ月後（最低 6 カ月後）

- 生ポリオワクチンを1回接種している方:不活化ポリオワクチン3回接種

初回接種（2回）：生ポリオワクチン接種後27日以上空けて20日以上の間隔で2回

追加接種（1回）：初回接種から12カ月～18カ月後（最低6カ月後）

- 生ポリオワクチンを2回接種している方:不活化ポリオワクチンの接種は不要です。