

リハビリの併用と 継続の必要性

ボツリヌス治療によって痙縮がやわらいでも、リハビリテーションを行わなければ機能の回復は望めません。

リハビリテーションを一緒に行うことによって、より日常生活が行いやすくなるのが期待できます。



受診予約やお問い合わせは、
診療科（脳神経外科 外来）へ
おかけください。

<予約センター>

TEL (052) 991-2116

交通のご案内



公共交通機関でお越しの方

- JR中央線「大隈駅（北口）」
名鉄瀬戸線「大隈駅」 西へ徒歩5分
- 地下鉄名城線「大隈駅」 3番出口より徒歩4分

お車でお越しの方

大隈駅から西へ300m、国道19号沿い南側に病院があります。

駐車場は、当院前の「OZパーキング」をご利用ください
※4番出入口エレベーターより正面玄関前に出られます
※外来患者様は、120分までの駐車料金を当院にて負担します。会計の際に駐車券を掲示下さい。

社会医療法人 大真会 大隈病院

〒462-0825 名古屋市北区大隈根2丁目9番34号

URL. [Http://ookuma-hospital.or.jp](http://ookuma-hospital.or.jp)

手足のつっぱり（痙縮）の ボツリヌス治療について



地域の皆様に信頼され、
愛される病院を目指し最善の医療を行う



社会医療法人 大真会
Oookuma Hospital
大隈病院



脳卒中の後遺症 「痙縮（けいしゅく）」とは

脳卒中後遺症の障害の一つに「痙縮（けいしゅく）」という症状があります。

痙縮とは筋肉が緊張しすぎて、手足が動かさにくかったり勝手に動いてしまう状態のことです。




ボツリヌス治療って何？

ボツリヌス治療とは、筋肉を緊張させている神経の働きを抑えるお薬を、筋肉に注射する治療法です。

ボツリヌス治療によって、痙縮そのものが治ることはありません。

ボツリヌス治療の効果




関節が固まって動きにくくなったり、変形することを防ぐことができる



手足のツッパリによる痛みがやわらぐ



リハビリが行いやすくなる



筋肉が、動かしやすくなり、日常生活が行いやすくなる

介護の負担が軽くなる

- 服の脱ぎ着きが行いやすくなる
- おむつ交換が行いやすくなる
- 体ふきが行いやすくなる

